

# IMPORTANT MEDICAL INFO



## **THIS PATIENT HAS DIABETES INSIPIDUS AND NEEDS DAILY REPLACEMENT WITH DESMOPRESSIN**

If the patient is conscious, she/he should take the usual daily desmopressin treatment and drink freely.

If the patient is not conscious, she/he should be hydrated with isotonic intravenous infusion and treated with desmopressin (i.v. or nasal) with close blood electrolyte monitoring.

Hypernatremia indicates lack of desmopressin, hyponatremia overtreatment.

---

*Name*

---

*Date of birth*



European Society  
of **Endocrinology**

# Важлива медична інформація



## **ЦЕЙ ПАЦІЄНТ ХВОРІЄ НА НЕЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ПОТРЕБУЄ ЩОДЕННОЇ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ ДЕСМОПРЕСИНОМ**

У разі невідкладного медичного або хірургічного стану:

Якщо пацієнт притомний, йому необхідно щодня приймати десмопресин і вживати багато рідини.

Якщо пацієнт непритомний, йому слід провести гідратацію шляхом внутрішньовенної інфузії ізотонічного розчину та лікування десмопресином (в/в або назально) з ретельним моніторингом рівня електролітів у крові.

Гіпернатріємія вказує на нестачу десмопресину, а гіпонатріємія — на передозування.

---

*П. І. Б.*

---

*Дата народження*